

Regeluntersuchungsprogramm nach Stich- und Schnittverletzungen (II)

Info-Box

Sichere
Produkte



Verletzter

Blutkontrollen

nach Stich-
verletzungen



zum Ausschluss

von:

- ➔ Hepatitis B ➔ (Anti HBC, Anti HBS) – nicht erforderlich, wenn Verletzter geimpft
- ➔ Hepatitis C ➔ (Anti HCV)
- ➔ HIV ➔ (Anti HIV)

Indexpatient*

Ausschluss von Hepatitis B, Hepatitis C und HIV (Schnelltest)

➔ Maßnahmen

Ist der
Indexpatient:

- ➔ Hepatitis B positiv? ➔ ja ➔ Verletzter geimpft? ➔ nein ➔ aktive und passive Immunisierung
- ➔ Hepatitis C positiv? ➔ ja ➔ PCR nach 2 – 4 Wochen ➔ Verletzter infiziert? ➔ Frühtherapie Ribavirin Interferon
- ➔ HIV positiv? (Schnelltest) ➔ ja ➔ 2 Stunden? Tiefe Verletzung? Großlumige Kanüle? ➔ ja ➔ Postexpositionsprophylaxe

*Besteht der Verdacht, dass der Indexpatient infektiös ist, kann der Ausschluss von Hepatitis B, Hepatitis C und HIV erforderlich werden.